

Verzorging van Citrusplanten.

Algemeen:

Een citrus is in zijn algemeenheid geen gemakkelijke plant om te verzorgen. Een belangrijk gegeven is dat deze planten in de winterdag binnen moet worden gestald. Dit i.v.m. vorstschade. Citrusbomen kunnen echter wel een paar graden vorst verdragen.

Het overwinteren van citrusplanten gaat het beste in een oranjerie met de ramen aan de zuidkant. Aangezien de meeste liefhebbers van deze plantengroep deze niet bezitten dient er een stallingruimte te zijn welke het dichtst bij deze omstandigheden, welke in een oranjerie aanwezig zijn, komt.

Het meest ideale is dat de ruimte voldoende zonlicht heeft (tot achterin de ruimte). De temperatuur in de wintermaanden moet rond de 5 tot 8 graden Celsius blijven. Ook is de luchtvochtigheid in de stallingruimte van groot belang. Deze moet ongeveer overdag 60% zijn en s' nachts ongeveer 80%.

Ook een belangrijk punt is dat de ruimte een goede luchtcirculatie moet hebben. Dit kan worden bereikt d.m.v. ventilatieroosters aan de achterwand (deze moet boven zijn geplaatst) en ventilatie roosters aan de voorkant van de stallingruimte, welke aan de onderzijde zijn geplaatst.

Plaatsen van de bomen in een kas kan natuurlijk ook. Een groot nadeel is dat de planten te veel licht krijgen, voornamelijk in maart en april. Hierdoor gaan de bomen, die eigenlijk nog in winterrust behoren te zijn, al uitlopen. Verder is de temperatuur in de kas moeilijker constant te houden.

Verzorging in de winterperiode.

De bomen worden ongeveer half oktober in de winterstalling gezet. Er moet dan goed worden bekeken als de bomen luisvrij zijn. Mochten er toch luizen op de planten zitten dan kunnen deze worden bestreden met Spruzit (biologisch) of Admire (chemisch).

In de winterperiode moet er zo weinig mogelijk water worden gegeven. De wortels mogen niet uitdrogen. Te veel water in deze periode veroorzaakt wortelrot. Een citrus die eenmaal wortelrot heeft komt hier bijna niet meer vanaf. Mesten hoeft vanaf half september ook niet meer. De plant kan dan nog afharderen voor de komende winterperiode.

In het vroege voorjaar wordt voorzichtig begonnen met het bemesten van de planten. Er wordt dan een kalkmeststof gegeven bijv. "Maerel". De beste periode om hier mee te beginnen is ongeveer half maart. Twee weken later dient er bloedmeel en beendermeel gegeven te worden.

Als de buitentemperaturen toenemen zal er ook meer water worden gegeven.

Na de eerste mestgift moet de plant blijvend worden bemest. Dit eens in de 4-6 weken met Bloedmeel. Maerel en beendermeel is dan niet meer noodzakelijk. Er kan af en toe ook wat gedroogde koemest worden gegeven. Van elk soort mest is een handjevol per keer voldoende.

Als de plant in een te kleine kuip/pot zit dan kan deze het best worden verpot in de maand april. Dit is tevens de beste tijd om te snoeien. Bij het snoeien moet er goed worden gelet op de vorm, deze moet wel in evenwicht zijn en blijven.

Ongeveer half mei (na de ijsheiligen) kunnen de planten buiten worden gestald. Houd er rekening mee dat de planten een lange periode geen direct zon licht hebben gehad. Er kunnen dus verbrandingsverschijnselen optreden. Dit kan worden voorkomen om de planten een tweetal dagen in de schaduw buiten te zetten. Ook helpt het als er een stuk vitrage over de plant wordt gelegd.

Als de bomen buitenstaan, is het wel zo dat er flink meer water moet worden gegeven. Ook hier mag de pot niet uitdrogen. Het beste kan er een flinke hoeveelheid water in een keer worden gegeven (tot aan de pot/kuip rand, het zogenaamde eb en vloed systeem) Het overtollige water loopt er vanzelf wel weer uit.

Hierboven staat globaal vermeld om een citrus plant goed te kunnen blijven verzorgen. Echter men moet niet vergeten dat het gaat om levend materiaal en dat er daarom geen standaard verhaal voor is. Het blijft maatwerk voor elke plant.

Bron : Website van de Nederlandse Oranjerievereniging

www.oranjerievereniging.nl